

FractionsQuickQuestions: key vocabulary

algebraic	algebraiczny — używający liter do oznaczania nieznanymi liczb.
common denominator	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
convert	zamieniać — zmieniać liczbę z jednej postaci na inną, np. liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.
decimal	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
decimal place	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
factor	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
improper fraction ..	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
mixed number	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3 \frac{1}{2}$.
multiple	wielokrotność — liczba, którą otrzymujesz, mnożąc inną liczbę przez liczbę całkowitą
negative	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
operation	działanie — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
percentage	procent — liczba części na sto
positive	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
reciprocal	odwrotność — liczba, przez którą mnożysz, aby otrzymać 1, znajdowana przez odwrócenie ułamka
recurring decimal ..	ułamek okresowy — ułamek dziesiętny, w którym cyfra lub grupa cyfr powtarza się w nieskończoność.
remainder	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
simplest form	najprostsza postać — ułamek zapisany za pomocą możliwie najmniejszych liczb nad i pod kreską.
simplify	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości

Match the English word to its Polish meaning

algebraic	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
common denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
convert	algebraiczny — używający liter do oznaczania nieznanymi liczb.
decimal	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
decimal place	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
denominator	zamieniać — zmieniać liczbę z jednej postaci na inną, np. liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.
factor	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3 \frac{1}{2}$.
fraction	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
improper fraction	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
mixed number	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
multiple	procent — liczba części na sto
negative	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
numerator	działanie — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
operation	wielokrotność — liczba, którą otrzymujesz, mnożąc inną liczbę przez liczbę całkowitą
percentage	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
positive	odwrotność — liczba, przez którą mnożysz, aby otrzymać 1, znajdowana przez odwrócenie ułamka
reciprocal	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
recurring decimal	liczba dodatnia — liczba większa od zera

Match the English word to its Polish meaning: answers

algebraic	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
common denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
convert	algebraiczny — używający liter do oznaczania nieznanów liczb.
decimal	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
decimal place	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
denominator	zamieniać — zmieniać liczbę z jednej postaci na inną, np. liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.
factor	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3 \frac{1}{2}$.
fraction	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
improper fraction	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
mixed number	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
multiple	procent — liczba części na sto
negative	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
numerator	działanie — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
operation	wielokrotność — liczba, którą otrzymujesz, mnożąc inną liczbę przez liczbę całkowitą
percentage	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
positive	odwrotność — liczba, przez którą mnożysz, aby otrzymać 1, znajdowana przez odwrócenie ułamka
reciprocal	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
recurring decimal	liczba dodatnia — liczba większa od zera