

Inequalities Starters: key vocabulary

at random	losowo — wybrany tak, że każdy element ma taką samą szansę bycia wybranym.
biased	obciążony — nie jest sprawiedliwy, więc niektóre wyniki są bardziej prawdopodobne niż inne.
branch	gałąź — jedna ścieżka w drzewie częstości, prowadząca do grupy lub podgrupy.
decimal	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
double inequality	nierówność podwójna — nierówność, która podaje zarówno dolne, jak i górne ograniczenie dla wartości.
filled circle	wypełnione kółko — małe wypełnione kółko na osi liczbowej pokazujące, że zaznaczona wartość jest uwzględniona.
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
frequency tree	drzewko częstości — diagram, który dzieli całość na grupy według dwóch cech
inclusive	włącznie — zawierający końcową liczbę w przedziale
inequality	nierówność — stwierdzenie, że jedna wielkość jest większa lub mniejsza od innej
integer	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
negative	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
number line	oś liczbową — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
open circle	puste kółko — małe puste kółko na osi liczbowej pokazujące, że zaznaczona wartość nie jest uwzględniona.
ordinary number	liczba w zwykłej postaci — liczba zapisana w zwykły sposób, a nie w notacji naukowej.
percentage	procent — liczba części na sto
power	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
probability	prawdopodobieństwo — jak prawdopodobne jest coś, podawane jako liczba między 0 a 1
product	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
satisfy	spełniać — sprawić, że zdanie staje się prawdziwe, gdy litera zostanie zastąpiona przez tę wartość.
simplest form	najprostsza postać — ułamek zapisany za pomocą możliwie najmniejszych liczb nad i pod kreską.
solve	rozwiązać — znaleźć wartość, która sprawia, że równanie jest prawdziwe

standard form	notacja naukowa — sposób zapisywania dużych lub małych liczb w postaci liczby między jeden a dziesięć pomnożonej przez potęgę dziesiątki.
strictly	ostro — używane w znaczeniu, że wartość końcowa nie jest uwzględniona.
sum	suma — wynik dodawania liczb

Match the English word to its Polish meaning

at random	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
biased	nierówność podwójna — nierówność, która podaje zarówno dolne, jak i górne ograniczenie dla wartości.
branch	obciążony — nie jest sprawiedliwy, więc niektóre wyniki są bardziej prawdopodobne niż inne.
decimal	wypełnione kółko — małe wypełnione kółko na osi liczbowej pokazujące, że zaznaczona wartość jest uwzględniona.
denominator	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
double inequality	losowo — wybrany tak, że każdy element ma taką samą szansę bycia wybranym.
filled circle	gałąź — jedna ścieżka w drzewie częstości, prowadząca do grupy lub podgrupy.
fraction	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
frequency tree	włącznie — zawierający końcową liczbę w przedziale
inclusive	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
inequality	puste kółko — małe puste kółko na osi liczbowej pokazujące, że zaznaczona wartość nie jest uwzględniona.
integer	drzewko częstości — diagram, który dzieli całość na grupy według dwóch cech
negative	procent — liczba części na sto
number line	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
numerator	liczba w zwykłej postaci — liczba zapisana w zwykły sposób, a nie w notacji naukowej.
open circle	nierówność — stwierdzenie, że jedna wielkość jest większa lub mniejsza od innej
ordinary number	oś liczbową — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
percentage	prawdopodobieństwo — jak prawdopodobne jest coś, podawane jako liczba między 0 a 1

spełniać — sprawić, że zdanie staje się

Match the English word to its Polish meaning: answers

at random	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
biased	nierówność podwójna — nierówność, która podaje zarówno dolne, jak i górne ograniczenie dla wartości.
branch	obciążony — nie jest sprawiedliwy, więc niektóre wyniki są bardziej prawdopodobne niż inne.
decimal	wypełnione kółko — małe wypełnione kółko na osi liczbowej pokazujące, że zaznaczona wartość jest uwzględniona.
denominator	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
double inequality	losowo — wybrany tak, że każdy element ma taką samą szansę bycia wybranym.
filled circle	gałąź — jedna ścieżka w drzewie częstości, prowadząca do grupy lub podgrupy.
fraction	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
frequency tree	włącznie — zawierający końcową liczbę w przedziale
inclusive	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
inequality	puste kółko — małe puste kółko na osi liczbowej pokazujące, że zaznaczona wartość nie jest uwzględniona.
integer	drzewko częstości — diagram, który dzieli całość na grupy według dwóch cech
negative	procent — liczba części na sto
number line	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
numerator	liczba w zwykłej postaci — liczba zapisana w zwykły sposób, a nie w notacji naukowej.
open circle	nierówność — stwierdzenie, że jedna wielkość jest większa lub mniejsza od innej
ordinary number	oś liczbową — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
percentage	prawdopodobieństwo — jak prawdopodobne jest coś, podawane jako liczba między 0 a 1