

NegativesPowersBidmasStarters: key vocabulary

area	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
BIDMAS	kolejność wykonywania działań — kolejność wykonywania obliczeń z różnymi działaniami
brackets	nawiasy — para znaków używana w matematyce do grupowania części wyrażenia.
bus stop division	dzielenie pisemne — pisemna metoda dzielenia, w której liczba, przez którą dzielisz, znajduje się na zewnątrz zakrzywionego kształtu
cube	sześcian — liczba, którą otrzymujesz, gdy wartość jest mnożona przez siebie dwukrotnie.
decimal	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
decimal place	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
decimal point	przecinek dziesiętny — przecinek używany do oddzielania części całkowitej liczby od części ułamkowej.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
difference	różnica — wynik odejmowania jednej liczby od drugiej
exponent	wykładnik — liczba w indeksie górnym pokazująca, ile razy pomnożyć liczbę przez siebie.
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
fraction bar	kreska ułamkowa — linia w ułamku, która oddziela górną liczbę od dolnej liczby
integer	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
lattice	krata — diagram w kratkę z liniami ukośnymi używany do mnożenia
negative	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
number line	oś liczbowa — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
operations	działanie — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
positive	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
power	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
rectangle	prostokąt — figura płaska mająca cztery proste boki i cztery kąty proste.
recurring decimal	ułamek okresowy — ułamek dziesiętny, w którym cyfra lub grupa cyfr powtarza się w nieskończoność.
recurring dot	kropka okresowa — kropka napisana nad cyfrą, aby pokazać, że powtarza się w nieskończoność
remainder	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
root	pierwiastek — liczba, która pomnożona przez samą siebie określoną liczbę razy daje inną liczbę

round	zaokrąglić — zastąpić liczbę pobliską prostszą liczbą
scaling	skalować — powiększać lub pomniejszać figurę tak, aby każda długość zmieniała się w ten sam sposób.
side length	długość boku — odległość wzdłuż jednego boku figury
square	podnieść do kwadratu; kwadrat — pomnożyć liczbę przez samą siebie; także figura płaska o czterech równych bokach i czterech równych kątach.
square root	pierwiastek — liczba, która pomnożona przez samą siebie określi liczbę razy daje inną liczbę
volume	objętość — ilość miejsca wewnątrz bryły
whole numbers	liczby całkowite nieujemne — liczby zero, jeden, dwa, trzy i tak dalej, bez części ułamkowej ani dziesiętnej.

Match the English word to its Polish meaning

area	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
BIDMAS	sześcian — liczba, którą otrzymujesz, gdy wartość jest mnożona przez siebie dwukrotnie.
brackets	przecinek dziesiętny — przecinek używany do oddzielania części całkowitej liczby od części ułamkowej.
bus stop division	nawiasy — para znaków używana w matematyce do grupowania części wyrażenia.
cube	różnica — wynik odejmowania jednej liczby od drugiej
decimal	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
decimal place	kolejność wykonywania działań — kolejność wykonywania obliczeń z różnymi działaniami
decimal point	kreska ułamkowa — linia w ułamku, która oddziela górną liczbę od dolnej liczby
denominator	dzielenie pisemne — pisemna metoda dzielenia, w której liczba, przez którą dzielisz, znajduje się na zewnątrz zakrzywionego kształtu
difference	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
exponent	krata — diagram w kratkę z liniami ukośnymi używany do mnożenia
fraction	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
fraction bar	wykładnik — liczba w indeksie górnym pokazująca, ile razy pomnożyć liczbę przez siebie.
integer	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
lattice	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
negative	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
number line	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
numerator	prostokąt — figura płaska mająca cztery proste boki i cztery kąty proste.

Match the English word to its Polish meaning: answers

area	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
BIDMAS	sześcian — liczba, którą otrzymujesz, gdy wartość jest mnożona przez siebie dwukrotnie.
brackets	przecinek dziesiętny — przecinek używany do oddzielania części całkowitej liczby od części ułamkowej.
bus stop division	nawiasy — para znaków używana w matematyce do grupowania części wyrażenia.
cube	różnica — wynik odejmowania jednej liczby od drugiej
decimal	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
decimal place	kolejność wykonywania działań — kolejność wykonywania obliczeń z różnymi działaniami
decimal point	kreska ułamkowa — linia w ułamku, która oddziela górną liczbę od dolnej liczby
denominator	dzielenie pisemne — pisemna metoda dzielenia, w której liczba, przez którą dzielisz, znajduje się na zewnątrz zakrzywionego kształtu
difference	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
exponent	krata — diagram w kratkę z liniami ukośnymi używany do mnożenia
fraction	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
fraction bar	wykładnik — liczba w indeksie górnym pokazująca, ile razy pomnożyć liczbę przez siebie.
integer	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
lattice	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
negative	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
number line	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
numerator	prostokąt — figura płaska mająca cztery proste boki i cztery kąty proste.