

FractionsOfAmountsStarters: key vocabulary

area model	model pola — diagram w kształcie prostokąta podzielony na mniejsze prostokąty, używany do pokazania, jak mnożyć ułamki.
bar model	model słupkowy — diagram złożony z prostokątów, który pokazuje części i całość równania.
common denominator	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
commutative	przemienny — opisuje działanie, którego kolejność nie wpływa na wynik.
counterexample	kontrprzykład — przykład, który dowodzi, że ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
highest common factor	największy wspólny dzielnik — największa liczba całkowita, która dzieli bez reszty dwie lub więcej liczb
improper fraction ..	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
mixed number	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3 \frac{1}{2}$.
multiply	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
product	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
proper fraction	ułamek właściwy — ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika.
simplify	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
sum	suma — wynik dodawania liczb

Match the English word to its Polish meaning

area model	model słupkowy — diagram złożony z prostokątów, który pokazuje części i całość równania.
bar model	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
common denominator	model pola — diagram w kształcie prostokąta podzielony na mniejsze prostokąty, używany do pokazania, jak mnożyć ułamki.
commutative	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
counterexample	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3\frac{1}{2}$.
denominator	kontrprzykład — przykład, który dowodzi, że ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe.
fraction	przemienny — opisuje działanie, którego kolejność nie wpływa na wynik.
highest common factor	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
improper fraction	największy wspólny dzielnik — największa liczba całkowita, która dzieli bez reszty dwie lub więcej liczb
mixed number	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
multiply	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
numerator	suma — wynik dodawania liczb
product	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
proper fraction	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
simplify	ułamek właściwy — ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika.
sum	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych

Match the English word to its Polish meaning: answers

area model	model słupkowy — diagram złożony z prostokątów, który pokazuje części i całość równania.
bar model	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
common denominator	model pola — diagram w kształcie prostokąta podzielony na mniejsze prostokąty, używany do pokazania, jak mnożyć ułamki.
commutative	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
counterexample	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3\frac{1}{2}$.
denominator	kontrprzykład — przykład, który dowodzi, że ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe.
fraction	przemienny — opisuje działanie, którego kolejność nie wpływa na wynik.
highest common factor	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
improper fraction	największy wspólny dzielnik — największa liczba całkowita, która dzieli bez reszty dwie lub więcej liczb
mixed number	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
multiply	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
numerator	suma — wynik dodawania liczb
product	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
proper fraction	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
simplify	ułamek właściwy — ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika.
sum	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych