

DevelopingAveragesStarters: key vocabulary

average	średnia — jedna wartość wybrana do reprezentowania całego zestawu danych
bimodal	dwumodalny — mający dwie wartości, które występują najczęściej na liście liczb.
common denominator	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
data	dane — zbiór zebranych wartości
even	parzysty — dający się dokładnie podzielić przez 2.
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
frequency	częstość — ile razy coś się zdarza
improper fraction	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
integer	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
mean	średnia — średnia obliczana przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie przez ich liczbę
median	mediana — środkowa wartość, gdy dane są uporządkowane
mode	dominanta — wartość, która pojawia się najczęściej
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
odd	liczba nieparzysta — liczba całkowita, której nie można podzielić dokładnie na dwie równe liczby całkowite.
outlier	wartość odstająca — wartość, która jest daleko od wszystkich pozostałych
positive	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
range	rozstęp — różnica między największą i najmniejszą wartością
set	zbiór — kolekcja liczb lub obiektów zgrupowanych razem.
symmetric	symetryczny — zrównoważony tak, że jedna strona jest lustrzanym odbiciem drugiej.
unique	jedyny — będący jedynym; tutaj: żadna inna wartość nie ma takiej samej liczebności jak dominanta.
value	wartość — liczba, którą oznacza litera lub symbol.

Match the English word to its Polish meaning

average	dwumodalny — mający dwie wartości, które występują najczęściej na liście liczb.
bimodal	dane — zbiór zebranych wartości
common denominator	częstość — ile razy coś się zdarza
data	parzysty — dający się dokładnie podzielić przez 2.
even	średnia — średnia obliczana przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie przez ich liczbę
fraction	średnia — jedna wartość wybrana do reprezentowania całego zestawu danych
frequency	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
improper fraction	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
integer	liczba nieparzysta — liczba całkowita, której nie można podzielić dokładnie na dwie równe liczby całkowite.
mean	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
median	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
mode	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
numerator	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
odd	rozstęp — różnica między największą i najmniejszą wartością
outlier	mediana — środkowa wartość, gdy dane są uporządkowane
positive	symetryczny — zrównoważony tak, że jedna strona jest lustrzanym odbiciem drugiej.
range	dominanta — wartość, która pojawia się najczęściej
set	wartość — liczba, którą oznacza litera lub symbol.
symmetric	zbiór — kolekcja liczb lub obiektów zgrupowanych razem.

Match the English word to its Polish meaning: answers

average	dwumodalny — mający dwie wartości, które występują najczęściej na liście liczb.
bimodal	dane — zbiór zebranych wartości
common denominator	częstość — ile razy coś się zdarza
data	parzysty — dający się dokładnie podzielić przez 2.
even	średnia — średnia obliczana przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie przez ich liczbę
fraction	średnia — jedna wartość wybrana do reprezentowania całego zestawu danych
frequency	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
improper fraction	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
integer	liczba nieparzysta — liczba całkowita, której nie można podzielić dokładnie na dwie równe liczby całkowite.
mean	liczba całkowita — liczba całkowita, która może być dodatnia, ujemna lub równa zero
median	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
mode	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
numerator	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
odd	rozstęp — różnica między największą i najmniejszą wartością
outlier	mediana — środkowa wartość, gdy dane są uporządkowane
positive	symetryczny — zrównoważony tak, że jedna strona jest lustrzanym odbiciem drugiej.
range	dominanta — wartość, która pojawia się najczęściej
set	wartość — liczba, którą oznacza litera lub symbol.
symmetric	zbiór — kolekcja liczb lub obiektów zgrupowanych razem.