

Calculations Revision: key vocabulary

absolute value	wartość bezwzględna — odległość liczby od zera, bez uwzględniania tego, czy jest ona dodatnia, czy ujemna.
addition	dodawanie — łączenie dwóch lub więcej liczb w celu znalezienia ich sumy.
altitude	wysokość — wysokość nad poziomem morza lub innym stałym poziomem odniesienia.
BODMAS	kolejność wykonywania działań — reguła, która mówi, które działanie wykonać najpierw w obliczeniach.
bracket	nawias — jeden z pary zakrzywionych symboli (), używany do grupowania liczb lub liter.
decimal	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
decimal place	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
decimal point	przecinek dziesiętny — przecinek używany do oddzielania części całkowitej liczby od części ułamkowej.
division	dzielenie — działanie polegające na podzieleniu liczby na równe części.
divisor	dzielnik — liczba, przez którą dzielona jest inna liczba.
even	parzysty — dający się dokładnie podzielić przez 2.
factor	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
magnitude	wartość bezwzględna — wielkość liczby bez jej znaku.
multiplication	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
negative	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
odd	liczba nieparzysta — liczba całkowita, której nie można podzielić dokładnie na dwie równe liczby całkowite.
operation	działanie — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
positive	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
power	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
prime number	liczba pierwsza — liczba całkowita większa od 1, której jedynymi dzielnikami są 1 i ona sama.
recurring decimal ..	ułamek okresowy — ułamek dziesiętny, w którym cyfra lub grupa cyfr powtarza się w nieskończoność.
remainder	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
sign	znak — Znak plus lub minus, który informuje, czy wartość jest dodatnia, czy ujemna.
subtraction	odejmowanie — proces odejmowania jednej wielkości od drugiej.
terminate	kończyć się — o ułamku dziesiętnym: kończyć się po ustalonej liczbie cyfr.
whole number	liczba całkowita nieujemna — liczba, która nie jest ujemna i nie ma części po przecinku, taka jak 0, 1, 2 lub 3.

Match the English word to its Polish meaning

absolute value	wysokość — wysokość nad poziomem morza lub innym stałym poziomem odniesienia.
addition	nawias — jeden z pary zakrzywionych symboli (), używany do grupowania liczb lub liter.
altitude	dodawanie — łączenie dwóch lub więcej liczb w celu znalezienia ich sumy.
BODMAS	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
bracket	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
decimal	wartość bezwzględna — odległość liczby od zera, bez uwzględniania tego, czy jest ona dodatnia, czy ujemna.
decimal place	dzielenie — działanie polegające na podzieleniu liczby na równe części.
decimal point	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
division	kolejność wykonywania działań — reguła, która mówi, które działanie wykonać najpierw w obliczeniach.
divisor	parzysty — dający się dokładnie podzielić przez 2.
even	przecinek dziesiętny — przecinek używany do oddzielania części całkowitej liczby od części ułamkowej.
factor	działanie — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
magnitude	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
multiplication	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
negative	dzielnik — liczba, przez którą dzielona jest inna liczba.
odd	liczba pierwsza — liczba całkowita większa od 1, której jedynymi dzielnikami są 1 i ona sama.
operation	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
positive	wartość bezwzględna — wielkość liczby bez jej znaku.
	ułamek okresowy — ułamek dziesiętny, w

Match the English word to its Polish meaning: answers

absolute value — **wysokość** — wysokość nad poziomem morza lub innym stałym poziomem odniesienia.

addition — **nawias** — jeden z pary zakrzywionych symboli (), używany do grupowania liczb lub liter.

altitude — **dodawanie** — łączenie dwóch lub więcej liczb w celu znalezienia ich sumy.

BODMAS — **ułamek dziesiętny** — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości

bracket — **miejsce dziesiętne** — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.

decimal — **wartość bezwzględna** — odległość liczby od zera, bez uwzględniania tego, czy jest ona dodatnia, czy ujemna.

decimal place — **dzielenie** — działanie polegające na podzieleniu liczby na równe części.

decimal point — **dzielnik** — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę

division — **kolejność wykonywania działań** — reguła, która mówi, które działanie wykonać najpierw w obliczeniach.

divisor — **parzysty** — dający się dokładnie podzielić przez 2.

even — **przecinek dziesiętny** — przecinek używany do oddzielania części całkowitej liczby od części ułamkowej.

factor — **działanie** — coś wykonanego na liczbie, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.

magnitude — **mnożyć** — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy

multiplication — **liczba dodatnia** — liczba większa od zera.

negative — **dzielnik** — liczba, przez którą dzielona jest inna liczba.

odd — **liczba pierwsza** — liczba całkowita większa od 1, której jedynymi dzielnikami są 1 i ona sama.

operation — **potęga** — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie

positive — **wartość bezwzględna** — wielkość liczby bez jej znaku.

ułamek okresowy — ułamek dziesiętny, w