

RecurringDecimalsToFractions: key vocabulary

decimal place	miejsce dziesiątne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
digit	cyfra — pojedynczy znak od 0 do 9, za pomocą którego zapisuje się liczbę
dot notation	notacja kropkowa — sposób zapisywania ułamka dziesiętnego okresowego przez umieszczenie kropki nad cyfrą lub cyframi, które się powtarzają.
equation	równanie — matematyczne stwierdzenie ze znakiem równości pokazujące, że obie strony są równe.
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
improper fraction ..	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
irrational	niewymierny — liczba, której część dziesiętna nigdy się nie kończy i nigdy się nie powtarza, więc nie można jej zapisać w postaci ułamka.
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
place value	wartość pozycyjna — wartość, jaką cyfra ma ze względu na to, gdzie znajduje się w liczbie
power	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
prime factor	czynnik pierwszy — Czynnik, który jest również liczbą pierwszą.
product	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
rational	wymierny — liczba, którą można zapisać jako ułamek dwóch liczb całkowitych.
recurring decimal ..	ułamek okresowy — ułamek dziesiętny, w którym cyfra lub grupa cyfr powtarza się w nieskończoność.
simplest form	najprostsza postać — ułamek zapisany za pomocą możliwie najmniejszych liczb nad i pod kreską.
terminating decimal	ułamek dziesiętny skończony — liczba, której cyfry po przecinku kończą się po ograniczonej liczbie miejsc.
variable	zmienna — litera oznaczająca wielkość, która może się zmieniać

Match the English word to its Polish meaning

decimal place — **mianownik** — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość

denominator — **notacja kropkowa** — sposób zapisywania ułamka dziesiętnego okresowego przez umieszczenie kropki nad cyfrą lub cyframi, które się powtarzają.

digit — **ułamek** — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę

dot notation — **równanie** — matematyczne stwierdzenie ze znakiem równości pokazujące, że obie strony są równe.

equation — **niewymierny** — liczba, której część dziesiętna nigdy się nie kończy i nigdy się nie powtarza, więc nie można jej zapisać w postaci ułamka.

fraction — **miejsce dziesiętne** — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.

improper fraction — **wartość pozycyjna** — wartość, jaką cyfra ma ze względu na to, gdzie znajduje się w liczbie

irrational — **cyfra** — pojedynczy znak od 0 do 9, za pomocą którego zapisuje się liczbę

numerator — **ułamek niewłaściwy** — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.

place value — **potęga** — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie

power — **ułamek okresowy** — ułamek dziesiętny, w którym cyfra lub grupa cyfr powtarza się w nieskończoność.

prime factor — **ułamek dziesiętny skończony** — liczba, której cyfry po przecinku kończą się po ograniczonej liczbie miejsc.

product — **wymierny** — liczba, którą można zapisać jako ułamek dwóch liczb całkowitych.

rational — **licznik** — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych

recurring decimal — **najprostsza postać** — ułamek zapisany za pomocą możliwie najmniejszych liczb nad i pod kreską.

simplest form — **zmienna** — litera oznaczająca wielkość, która może się zmieniać

terminating — **czynnik pierwszy** — Czynnik, który jest

Match the English word to its Polish meaning: answers

decimal place — **mianownik** — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość

denominator — **notacja kropkowa** — sposób zapisywania ułamka dziesiętnego okresowego przez umieszczenie kropki nad cyfrą lub cyframi, które się powtarzają.

digit — **ułamek** — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę

dot notation — **równanie** — matematyczne stwierdzenie ze znakiem równości pokazujące, że obie strony są równe.

equation — **niewymierny** — liczba, której część dziesiętna nigdy się nie kończy i nigdy się nie powtarza, więc nie można jej zapisać w postaci ułamka.

fraction — **miejsce dziesiętne** — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.

improper fraction — **wartość pozycyjna** — wartość, jaką cyfra ma ze względu na to, gdzie znajduje się w liczbie

irrational — **cyfra** — pojedynczy znak od 0 do 9, za pomocą którego zapisuje się liczbę

numerator — **ułamek niewłaściwy** — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.

place value — **potęga** — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie

power — **ułamek okresowy** — ułamek dziesiętny, w którym cyfra lub grupa cyfr powtarza się w nieskończoność.

prime factor — **ułamek dziesiętny skończony** — liczba, której cyfry po przecinku kończą się po ograniczonej liczbie miejsc.

product — **wymierny** — liczba, którą można zapisać jako ułamek dwóch liczb całkowitych.

rational — **licznik** — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych

recurring decimal — **najprostsza postać** — ułamek zapisany za pomocą możliwie najmniejszych liczb nad i pod kreską.

simplest form — **zmienna** — litera oznaczająca wielkość, która może się zmieniać

terminating — **czynniki pierwsze** — Czynniki, który jest